

ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADAMENTE O RÓTULO. EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, CONTACTAR O DISTRIBUIDOR.

Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação de um pesticida, a nossa responsabilidade limita-se apenas à qualidade do produto

Armazenamento e eliminação: Manter fora do alcance de crianças. Proteger do superaquecimento. Armazenar na embalagem original fechada, em local seco, fresco e ventilado. Não transportar e não guardar junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, etc. Não contamine e nem descarte nos sistemas de esgotos, piscinas, barragens, rios ou qualquer outra fonte de água. Em caso de necessidade de despejo entrar em contacto com autoridade local competente. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados pelas autoridades ambientais.

É proibida a reutilização e a reciclagem de embalagem vazia, ou o fraccionamento e reembalagem do produto.

Precauções:

- Não comer, beber ou fumar quando usar o produto.
- Após o uso lavar bem as mãos, braços, e rosto com água e sabão.
- Não manusear o produto em caso de gestação e amamentação.
- Ao manusear o produto usar equipamentos de protecção pessoal (EPP), vestindo macacão, botas ou sapatos cobertos, avental, máscara facial, óculos de protecção, touca ou capacete, e luvas, com isso evitando qualquer contacto do corpo com o produto.

Distribuidor e detentor da marca:

AGRO SYSTEMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/nº, Condomínio Comercial Espaços Avenida - Loja LPS 02, Bairro Talatona - Luanda - Angola - Tel (+244) 939 633 130 - Email: geral@agrosystems.co.ao
www.agrosystems.co.ao

Fabricante:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.
4th Floor, Building 5, Castd Innovation Plaza - No.150 Pubin Road Jiangbei New Area - Nanjing 211800 - China



GLIFOSYSTEMS-SL HERBICIDA AGRÍCOLA

Herbicida agrícola com Registo Nº HB 251, do Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola.

GLIFOSYSTEMS-SL é um herbicida sistêmico não selectivo, pré-plantio e pós-emergente, para a utilização na agricultura, também para as superfícies não agrícolas, como áreas industriais, linhas férreas, rodoviárias, etc. O produto combate as plantas infestantes anuais e perenes (folhas estreitas e folhas largas), vegetação arbórea, e também como dessecante de várias culturas.

Substância activa: GLIFOSATO-Sal de Amónio 480 g/L - SL

Concentrado Solúvel (SL)

Conteúdo: 1 Litro



Primeiros socorros: Após os primeiros sinais de envenenamento, como náuseas, vômito, dor-de-cabeça, tonturas, salivação e lacrimação, dificuldade de respirar, deve parar imediatamente o trabalho e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente a roupa e o equipamento de protecção pessoal (EPP), evitando o contacto com o produto.

- *Em caso de inalação:* leve a vítima para o ar fresco.
- *Em caso de contacto com a pele:* remover o produto com pedaço de tecido, lã ou papel macio, sem esfregar muito, lavando a parte contaminada com água e sabão.
- *Em caso de contacto com vestuário:* remover roupas e sapatos contaminados e lavar bem com água.
- *Em caso de contacto com os olhos:* imediatamente lavar os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa corrente.
- *Em caso de ingestão:* lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1kg de sorvente por kg de peso corporal). Atenção para não provocar vômito.

Após os primeiros socorros, consultar um médico imediatamente. É aconselhável entregar o rótulo da embalagem ao médico.

Informações sobre a cultura e aplicação			
Nunca exceder a dose recomendada			
Objecto Prejudicial		Dose de consumo L/ha	Volume de calda L/ha
Plantas infestantes Anuais	Folhas Estreitas	2,0 - 4,0	450 - 600
	Folhas Largas		
Plantas infestantes Perenes	Folhas Estreitas		
	Folhas Largas		

- Aplicação em área total em pré-plantio (pré-plantio da cultura e pós-emergência das plantas infestantes), ou no controle de plantas infestantes em pós-emergência de áreas cultivadas, sob as copas e nas entrelinhas, utilizando equipamento de protecção de deriva.
- Intervalo de segurança como pós-emergência nas culturas algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho, soja, e trigo - não determinado devido a modalidade de uso.
- Intervalo de segurança como pós-emergente na: banana 30 dias; café 15 dias; citrinos 30 dias; maçã 15 dias; uva 17 dias.
- Número máximo de aplicações: 1.

Nº do lote: AGRO20220617
Válido até JULHO DE 2025

CLASSE DE PERIGO: ||| (OMS)
Ligeiramente tóxico - Atenção

