



GLIFOSYSTEMS-WSG

HERBICIDA AGRÍCOLA

ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO. EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, CONTACTAR O DISTRIBUIDOR.

Herbicida agrícola com Registo N° HB 248, do Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola.

SUBSTÂNCIA ACTIVA: GLIFOSATO- Sal de Amónio 747 g/kg - WSG

**GRÂNULOS DISSOLÚVEL EM ÁGUA (WSG)
CONTEÚDO: 1 KG**

GLIFOSYSTEMS-WSG é um herbicida granulado dissolúvel em água, sistêmico não selectivo, pré-plantio e pós-emergente para controlo de ervas gramíneas anuais e perenes, nas culturas agrícolas e hortícolas. Devido às suas propriedades sistêmicas, permite o controlo total das plantas daninhas monocotiledóneas e dicotiledóneas, que são atingidas na parte aérea e nas raízes pela acção do herbicida.

Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação de um pesticida, a nossa responsabilidade limita-se apenas à qualidade do produto.

Armazenamento e eliminação: Manter fora do alcance de crianças. Proteger do superaquecimento. Armazenar na embalagem original fechada, em local seco, fresco e ventilado. Não transportar e não guardar junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, etc. Não contamine e nem descarte nos sistemas de esgotos, piscinas, barragens, rios ou qualquer outra fonte de água. Em caso de necessidade de despejo entrar em contacto com autoridade local competente. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados e acordados com as autoridades ambientais.

É proibida a reutilização e a reciclagem de embalagem vazia, ou o fraccionamento e reembalagem do produto.



Distribuidor e detentor da marca:

AGRO SYSTEMS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/nº,
Condomínio Comercial Espaços Avenida – Loja LPS 02 –
Bairro Talatona – Luanda – Angola
Tel (+244) 939 633 130 – Email: geral@agrosystems.co.ao
www.agrosystems.co.ao



Fabricante:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.
4th Floor, Building 5, Castd Innovation Plaza No. 150
Pubin Road – Jiangbei New Area – Nanjing 211800 –
China

N° do lote: AGRO20220617

Válido até Julho de 2025



**CLASSE DE PERIGO: ||| (OMS)
Ligeiramente tóxico - Atenção**





GLIFOSYSTEMS-WSG

HERBICIDA AGRÍCOLA

Precauções:

- Não comer, beber ou fumar quando usar o produto.
- Após o uso lavar bem as mãos, braços e rosto com água e sabão.
- Não manusear o produto em caso de gestação e amamentação.
- Ao manusear o produto usar equipamentos de protecção pessoal (EPP), vestindo macacão, botas ou sapatos cobertos, avental, máscara facial, óculos de protecção, touca ou capacete, e luvas, com isto evitando qualquer contacto do corpo com o produto.

Primeiros Socorros:

Aos primeiros sinais de envenenamento, como náuseas, vômitos, dor-de-cabeça, tonturas, salivação e lacrimação, dificuldade de respirar, deve parar imediatamente o trabalho e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente a roupa e o equipamento de protecção pessoal, evitando o contacto com o produto.

- *Em caso de inalação* : leve a vítima para o ar fresco.
- *Em caso de contacto com a pele* : remover o produto com pedaço de tecido, lã ou papel macio, sem esfregar muito, lavando a parte contaminada com água e sabão.
- *Em caso de contacto com o vestuário* : remover roupas e sapatos contaminados e lavar com água.
- *Em caso de contacto com os olhos* : imediatamente lavar os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa corrente.
- *Em caso de ingestão* : lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1 kg de sorvente por kg de peso corporal). Atenção para não provocar o vômito.

Após os primeiros socorros, consultar um médico imediatamente. É aconselhável entregar o rótulo da embalagem ao médico.

Informações sobre a cultura e aplicação Nunca exceder a dose recomendada			
Objecto Prejudicial		Dose de Consumo kg/ha	Volume de Calda L/ha
Plantas Infestantes Anuais	Folhas Estreitas	1,5 - 3,3	450 - 600
	Folhas Largas		
Plantas Infestantes Perenes	Folhas Estreitas		
	Folhas Largas		

- Aplicação em área total em pré-plantio (pré-plantio da cultura e pós-emergência das plantas infestantes), ou no controle de plantas infestantes em pós-emergência de áreas cultivadas, sob as copas e nas entrelinhas, utilizando equipamento de protecção de deriva.
- Intervalo de segurança como pós-emergência nas culturas algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho, soja, e trigo – não determinado devido a modalidade de uso.
- Intervalo de segurança como pós-emergente na: banana 30 dias; café 15 dias; citrinos 30 dias; maçã 15 dias; uva 17 dias.
- Número máximo de aplicações: 1



CLASSE DE PERIGO: III (OMS)
Ligeiramente tóxico - Atenção

